



# اروپايي سره سپړی



تېلېفون: 977-758-0799 برېښنالیک: javid.hamidzada@rootsofpeace.org



بالغه سره اروپايي سپړی (پاسنی تصویر) او د یلی تخریب (لاندی تصویر)

## د سپړی تشریح

اروپايي سره سپړی (علمي نوم يې **panonychus ulmi**) پېټول ژمي کي دهگيو په څير د غټيو په بېخ کي ځاي نيسي او په ورو څنگو، د ونو پټونو او د پوستکي په درزنو او چاودونو کي سپورونه جوړي. هگي سور رنگ لري چي د مرکز څخه يي سلنډر ډوله ډنډر راپورته کيږي. د هگي څخه نوي راوتلي پرسيدلي سپړي شين رنگ لري خو د تغذي څخه وروسته يي رنگ سور کيږي. دا سپړی په خپله شا د وينټانو په بېخ کي سپړتکي لري. دا سپړی په کال کي د ۱۰-۵ پوري نسلونه توليدوي.

## تخریب

سری اروپايي سپړی د پېلو د بي رنگه کيدو سبب کيږي. اوردمهاله تغذيه د دي سبب کيږي چي پېله سپړه، او ژيربخونته او په څوکه او څنډو کي سوځي. د بادام هغه ونې چي د اوبو يا نورو فکوروونو له کبله تر فشار لاندې نه وي راغلي کولاي شي چي د ډير شمير (تر ۵۰ سپړي پرته له دي چي پېله و غورزي، وز غمي. په هر صورت دا شمير د ونې وده ورو کوي يا يې پټپه دروي. که چيري نېلگي تر فشار لاندې راغلي وي، د سپړيو لوړه سويه کولاي شي چي د پېلو د توپندو سبب شي. په لږه اندازه سپړي گټورې واقع کيږي، ځکه دا د نورو يرغگرو سپړيو يا حشراتو لپاره لومړني خواړه جوړوي. په هر صورت په بوز غليو کي بايد د سپړيو د نفوس ډيريدو ته اجازه ور نه کړي، ځکه چي د حشراتو ډيريدل د نيلگيو وده کمزوري کوي.

## کنترول

**دوديز کنترول:** ډيري وختونه ستونځه د حشراتو ضد درمل نگټي اخستلو څخه (هم په بوز غلي او هم پکاونډيو کروندو کي) منځ ته راځي. د حشراتو ضد ډيري درملونه چي د نورو حشراتو د کنترول لپاره په کار وړل کيږي، طبيعي حشره خوړونکي له منځه وړي او سپړيو ته اجازه ورکوي چي ډيري شي. په ځانگړي توگه په هغو بوز غليو کي چي د مالوچو کروندو ته نږدې وي ډيري وختونه په کي د سپړيو ستونځه ليدل کيږي ځکه چي د مالوچو په کرونده کي د ډيرو درملو گڼه اخستل حشره خوړونکي وژني او د سپړيو د شمير د ډيريډو سبب کيږي.

**زارعتي کيمياوي مواد\*:** که چيري د سپړيو يرغل ځوالمن وي، نو کيږي شي چي د کيمياوي موادو څه گټي اخستو ته اړتيا پيدا شي.

رقیق نیل	Amt / ha (153 L / h H2O)
Omni Supreme او نور	۹-۶ لیټره
د اغيزې ټول: د تماس په واسطه وژل او محدودولو اغيزي.	
احتیاط: د ونو د مسموم کيدو څخه د ونود پښه او په کولو په واسطه مخنيوی وکړئ نیل یواځې په تماس سره کار کوي، ځکه خو ونې باید په نیلو بانې پښې لنډې شي.	
ABAMECTIN* (ابامکتین)	0.12-0.24 لیټره
(Agri-Mek) 0.15 EC	
احتیاط: کيږي شي چي د نیلو سره یوځای شي د ودي پر موسم کي د دوه ځله څخه يې ډير مه تطبیقوي او د هرځل درملني ترمنځ ۲۱ ورځې وخت ورکړئ. د هر هکار لپاره د ۰.۲۴ لیټرو څخه ډير په هر وار کي مه کاروئ.	
PROPARGITE	0.574-0.766 لیټره
(Omite) 6EC	
(Omite) 30WP	0.3671 – 1.4685 کیلوگرامه
احتیاط: په یو موسم کي يې د دوه ځلي څخه يې ډير مه تطبیقوي. د نیلو د تطبیق څخه يې لږترلږه ۴۰ ورځې مخکي او ۳۰ ورځې مخکي مه تطبیقوي.	

\*په یاد ولري چي هرکله د توليدونکو کمپنيو لارښوونې ولولئ او عمل پري وکړئ.

## د جان ډرايور، کورکي لوين او مارک په واسطه چمتو شوی، د ۱۳۸۷ کب میاشت

دا څېړونه د اروپايي اتحاديې، د نوالی د پرمختيا پرگرام، د بادامو د صنعت د پرمختيا د پروژي په مالي مرسته، د سولي بنسټ د موسسې د ASIE/2007/135-504 قرار داد لاندې چمتو شوي. کابل تېلېفون 794677212 (0) +93، [zach@rootsofpeace.org](mailto:zach@rootsofpeace.org)  
ددي څېړونې د محتواي مسوليت په بشپړه توگه د کاليفورنيا د ډيوس پوهنتون په غاړه دی او په هيڅ صورت سره د اروپايي اتحاديې د نظر څرگندوبه نه ده.  
د څېړيدو حق © UC Regents Davis campus، 2009. بېلابېلې حقوق خوندي دي.



ROOTS OF PEACE



د ډيرو معلوماتو لپاره د: [http://ec.europa.eu/europeaid/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm), [www.ip.ucdavis.edu](http://www.ip.ucdavis.edu), [www.rootsofpeace.org](http://www.rootsofpeace.org) مراجعه وشي